


これまで3年間、年末年始に新型コロナは流行しています。令和5年秋以降、重症化リスクの高い高齢者等にはXBB.1.5対応ワクチンの接種をおすすめします。若い方も接種できます。

〈日本国内の新規感染者数(1日ごと)〉



XBB.1.5 対応ワクチンの 効果

- 非臨床試験において、追加接種(4回目接種)として、XBB.1.5 対応ワクチンを投与したマウスでは、投与の1か月後にオミクロン株 XBB 系統(XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.1.16.1、XBB.2.3、EG.5.1) に対して中和抗体の誘導が認められました。
出所：厚生・食品医薬品等省発表資料
- この試験での中和抗体価のデータに加えて、これまでの2価ワクチンに関する知見を踏まえて、XBB.1.5 対応ワクチンにはオミクロン株 XBB 系統への有効性が期待できると考えられます。

XBB.1.5 対応ワクチンの 安全性

- ファイザー社、モデルナ社のXBB.1.5 対応ワクチンについて、各年齢において、下のような副作用が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副作用としてショック、アナフィラキシー、心筋炎、心臓炎が知られています。

発現割合	ファイザー社のワクチン			モデルナ社のワクチン
	6か月～4歳	5～11歳	12歳以上	6歳以上
50%以上	易刺激性(※1)	疼痛(※2)、疲労	疼痛(※2)、頭痛、疲労	疼痛(※2)、頭痛、筋肉痛、疲労
5～50%	疼痛(※2)、発赤・紅斑、腫脹(※3)、顔腫(※4)、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒	発赤・紅斑、腫脹(※3)、頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱	腫脹(※3)、発赤・紅斑、下痢、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、発熱	腫脹・硬結(※5)、発赤・紅斑、悪心・嘔吐、関節痛、リンパ節症(※6)、悪寒、発熱
1～5%	関節痛	嘔吐		過敏性反応(疼痛・腫脹・紅斑等)(※7)

(※1) 易刺激性：機嫌が悪い (※2) 疼痛：注射部位のみ (※3) 腫脹：注射部位の腫れ (※4) 顔腫：顔がむくむ様子 (※5) 腫脹・硬結：注射部位の腫れ、固くなること (※6) リンパ節症：注射部位と別の体の別の部分のみ (※7) 過敏性反応：接種後7日以内の痛みや痒みなど
出典：厚生労働省「ファイザー社 6～4歳用、モデルナ社 5～11歳用、モデルナ社 RTU 用法、スパイクバックス用法(1価・2価)」

◎ワクチンを受けるにはご本人または保護者の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副作用のリスクの両方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人または保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。職場や園の方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起ることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことのできないことから、救済制度が設けられています。申請が必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧にならない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

お問合せ先

1 接種対象者

初回接種を終了した生後6か月以上のすべての方

※初回接種とは

- ・12歳以上の方、5歳から11歳の方は1・2回目の接種
- ・生後6か月～4歳の方は、1・2・3回目の接種